00054741

Digitized with financial assistance from
Observer Research Foundation
on 17 May, 2019

Amerikaniſche
Gewächſe
nach
Linneiſcher Ordnung.

Des dritten Hunderts erſte Hälfte
von
Tab. 201. bis 250.

54741

Nürnberg,
auf Koſten der Raſpiſchen Buchhandlung.
1787.

O
580.73
Jac/Doe
54741

580
00054741

Tab. 201.

Lippia haemisphaerica. Lin. Gen. 844. Spec. 2. p. 187.
Halbkugelrunde Lippie. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 89.
a. Der Fruchtknoten.
b. Die Saamenkapſel in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab 168.

Tab. 202.

Barleria hirſuta. Jacquin. Gen. 848.
Barlerie. Linn. Pflanzenſyſt. 8 Th. S. 174.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 172.

Tab. 203.

Durantà Elliſia. Linn. Gen. 849. Spec. 2. p. 195.
Elliſiſche Durante. Lin. Pflanzenſ. 4 Th. S. 92.
a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in Jamaika. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 179.

Tab. 204.

Volkameria aculeata. Lin. Gen. 851. Spec. 1. p. 196.
Stachlichte Volkamerie. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 94.
a. Aufgeſchnittener Saamen in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 177.

Tab. 205.

Avicennia nitida. Linn. Gen. 855. Spec 2. p. 201.
Glatte Avicennie. Linne Pflanzenſyſt. 2 Th. S. 138.
a. Ein blühender Zweig, natürlich groß.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 169.

Tab. 206.

Columnea ſcandens. Lin. Gen. 856. Spec. 1. p. 201.
Kletternde Columnee. Linne Pflanzenſ. 8 Th. S. 179.
a. Die Frucht, natürlich groß.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 170.

Tab. 207.

Melianthus major. Linn. Gen. 859. Spec. 1. p 204.
Gröſſere Honigblume. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 106.
a. Die ganze Blume.
b. Der fünftheilige groſſe Kelch, ſo die Oberlippe macht.
c. Die vierblättrige Krone, ſo die Unterlippe macht.
d. Die unterſten ſackförmigen Lappen des Kelchs.
e. Ein Kronblatt.
f. Das Honigbehältniß innerhalb dem Sack d.
g. Die zwey längern und zwey kürzern Staubfäden, nebſt dem Stempfel.
h. Der Fruchtknoten etwas geöfnet.
i. Der Griffel mit der vierſpaltigen Narbe.
k. Die Saamenkapſel.
l. Der untere Theil derſelben mit den vier Saamen.
m. Saamen.

Wächſt in Aethiopien.

Miller illuſtr. Tab. 53.

Tab. 208.

Ruſſelia ſarmentoſa. Jacquin.

Wächſt in Havana. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 171.

EX CLASSE XVta.

Tab. 209.

Cleome procumbens. Linn. Gen. 890. Spec. 18. p 296.
Liegende Cleome. Linn. Pflanzenſyſt. 8 Th. S. 390.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 181.

EX CLASSE XVIta.

Tab. 210.

Geranium peltatum Linn. Gen. 897. Spec. 13. p. 311.
Schildförmiger Storchſchnabel. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 130.
a. Die fünfblättrige Blumendecke.
b. Die fünfblättrige Krone.
c. Die zehn zuſammen verwachſenen Staubfäden, nur ſieben haben Staubbeutel.
d. Eben dieſe ausgebreitet.
e. Der fünfeckigte Fruchtknoten mit dem Griffel und den fünf Narben.
f. Der Fruchtknoten von oben.

Wächſt in Afrika.

Nach der Natur.

Tab.

Tab. 211.

Geranium odoratiſſimum. Linn. Gen. 897. Spec. 21. p. 313.
Starkriechender Storchſchnabel. Linne Pflanzenſ. 8 Th. S. 393.

a. Die fünfblättrichte Blumendecke.
b. Die fünfblättrichte Krone.
c. Ein Kronblatt mit dem Nagel.
d. Die zehn unten zuſammenhängenden Staubfäden, deren ſieben Staubbeutel haben.
e. Zwey abgeſonderte.
f. Der Fruchtknoten mit denen daran ſtehenden fünf Drüſen, dem Griffel und den fünf zurükgeſchlagenen Narben.

Wächſt in Afrika.
Nach der Natur.

Tab. 212.

Geranium triſte. Lin. Gen. 897. Spec. 30. p. 317.
Trauriger Storchſchnabel. Linne Pflanzenſ. 8 Th. S. 399.

a. Die fünfblättrichte Blumendecke.
b. Die fünfblättrichte Krone.
c. Ein Kronblatt mit dem Nagel.
d. Die zehn unten zuſammenhängenden Staubfäden, deren ſieben Staubbeutel haben.
e. Ein abgeſonderter Staubfaden.
f. Der Fruchtknoten, Griffel und fünf zurükgeſchlagenen Narben.
g. Der Saamen.

Wächſt auf dem Vorgebürge der guten Hofnung.
Nach der Natur.

Tab. 213.

Brownea coccinea. Linn. Gen. 898. Spec. 1. p. 330.
Scharlachrothe Brownie. Lin. Pflanzenſ. 2 Th. S. 146.

a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Venezuela. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 183.

Tab. 214.

Pentapetes phoenicea. Linn. Gen. 899. Spec. 1. p. 330.
Scharlachrother Pentapetes. Linne Pflanzenſyſt. 8 Th. S. 427.

a. Die dreyblättrige Hülle.
b. b. Die fünftheilige Blumendecke.
c. Die fünfblättrige Krone von unten.
d. Eben dieſe von oben, mit den Staubfäden.
e. Die funfzehn fruchtbaren, und fünf höhern unfruchtbaren Staubfäden.

f. Drey abgesonderte, zwischen welchen immer ein unfruchtbarer stehet.
g. Der Stempfel.
h. Die holzigte Saamenkapsel.
i. Diese entzwey geschnitten.
k. Eben diese aufgesprungen.
l. Ein Fach derselben.
m. Saamen.

Wächst in Indien.
Miller Illustr. Tab. 58.

Tab. 215. 216.

Bombax pentandrum. Linn. Gen. 901. Spec. 1. p. 332.
Wollsaamen mit fünf Staubfäden. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 161.
a. Die Blüthe.
b. Der Kelch.
c. Der Stempfel.
d. d. Zwey Stacheln von verschiedener Gestalt. Alle vier in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 182.

Tab. 217.

Sida triquetra. Linn. Gen. 902. Spec. 7. p. 335
Dreyeckigte Sida. Linn. Pflanzenf. 8 Th. S. 432.
a. Die Blume.
b. Die Saamenkapsel. Beide natürlich groß.

Wächst in Domingo. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 184.

Tab. 218.

Sida cristata. Linn. Gen. 902. Spec. 21. p. 339.
Kammförmige Sida. Linne Pflanzenf. 8 Th. S. 440.
a. Die halbfünfspaltige Blumendecke.
b Die fünfblättrige Krone.
c. Diese abgesondert.
d. Die zusammen verwachsenen Staubfäden.
e. Ein abgesonderter.
f. Der Fruchtknoten, vielspaltige Griffel, und knöpfigen Narben
g. Die achtfächerige Saamenkapsel.
h. Ein einfach abgesonderter.
i. Saamen.

Wächst in Mexico.
Nach der Natur.

Tab. 219.

Hibiscus spinifex. Linn. Gen. 911. Spec. 11. p. 361.
Stachlichter Hibiscus. Linne Pflanzenf. 4 Th. S 156.
a. Eine abgesonderte Saamenkapsel.

Wächst in den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 185

Tab.

Tab. 220.

Morisonia americana. Linn. Gen. 916. Spec. 1. p. 3'9.
Amerikanische Morisonie. Lin. Pflanzensſ. 2 Th. S 179.
a. Die aufgeſchnittene Frucht.
b. Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena und Martiniquè. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 144.

EX CLASSE XVIIma.

Tab. 221.

Securidaca volubilis. Linn. Gen. 922 Spec. 2. p. 392.
Securidaca ſcandens. Jacq.
Steigender Beilſtrauch. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 183.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 186.

Tab. 222.

Niſſolia fruticoſa. Linn. Gen. 923. Spec. 2. p. 393.
Strauchartige Niſſolie. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 185.
a. Der Kelch.
b. Die Schmetterlingsförmige Krone.
c. Die Fahne.
d. Ein Flügel.
e. Das Schiffgen.
f. Die zehn Träger in eine Walze verwachſen.
g. Der Stempfel.
h. Die Frucht.
i. Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 187.

Tab. 223.

Dolichos altiſſimus. Linn. Gen. 941. Spec 8. p. 447.
Höchſte Faſeln. Lin. Pflanzenſ. 8 Th. S. 553.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab 190.

Tab. 224.

Dolichos urens Linn. Gen. 941. Spec. 10. p. 448.
Brennende Faſeln. Lin. Pflanzenſyſt. 5 Th. S. 557.
a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 189.

Tab. 225.

Dolichos ruber. Jacquin.
Dolichos caule volubili; leguminibus racemoſis compreſſis: calycibus quadrifidis. Gen. 941.

a. Saa-

a. Saamen, in natürlicher Grösse.

Wächst in Martinique. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 191.

Tab. 226.

Galega littoralis. Lin. Gen. 963. Spec. 3. p 522.

Ufer Gaißraute. Linne Pflanzensyst. 8 Th. S. 673.

a. Die Schotte.

b. Der Saamen. In natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 192.

Tab. 227.

Galega caribaea. Lin. Gen. 963. Spec. 8. p 523.

Karibäische Gaißraute. Linne Pflanzenf. 8 Th. S. 675.

a. Saamen, natürlich.

Wächst in den Karibäen. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 193.

EX CLASSE XVIIIva.

Tab. 228.

Theobroma augusta. Linn. Gen. 972. Spec. 3. p. 583.

Der prächtige Kakaobaum. Lin. Pflanzenf. 2 Th. S. 224.

a. Die fünftheilige Blumendecke von unten.

b. Diese von oben.

c. Die fünfblätterige Blume.

d. d. Ein Kronblatt, mit einem daran hängenden Schuppen des äussern Honigbehältnisses, von innen.

e. Dieses von aussen.

f. Das innere Honigbehältniß.

g. Die in verschiedene Partheien verwachsene Staubfäden sizen aussen an den Spalten der Schuppen des innern Honigbehältnisses.

h. Eine Parthie dieser Staubfäden.

i. Der Fruchtknoten mit den fünf Griffeln und spizigen Narben.

k. Eben dieser abgesondert.

l. Dieser durchschnitten.

m. Die fünfächerige Saamenkapsel.

n. Diese geöfnet.

o. Saamen, natürlich und vergrössert.

Wächst in Ostindien.

Miller illustr. Tab. 63.

EX CLASSE XIXna.

Tab. 229.

Spilanthus urens. Linn. Gen. 1011. Spec. 1. p. 701.

Brennende Fleckblume. Linne Panzenf. 9 Th. S. 215.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 194.

Tab.

Tab. 230.

Spilanthus brasilienſis. Gen. 1011. Eine neue Art.

a. Der Durchſchnitt der ganzen Blume.
b. Ein Zwitterkröngen.
c. Die fünf zuſammenhängenden Staubfäden aus demſelben.
d. Der Fruchtknoten, Griffel, gekrümmte Narben.

Wächſt in Braſilien.
Nach der Natur.

Tab. 231.

Arthemiſia chinenſis. Linn. Gen. 1025. Spec. 22. p. 745.
Chineſiſcher Beifuß. Linne Pflanzenſ. 9 Th. S. 288.

a. Die gemeinſchaftliche Blumendecke.
b. Ein Zwitterkröngen.
c. Die fünf Staubfäden aus demſelben.
d. Der Stempfel.
e. Ein weibliches Krönchen.
f. Der Stempfel deſſelben.
g. Ein dreylappichtes unteres Blatt.

Wächſt in China.
Nach der Natur.

Tab. 232.

Gnaphalium orientale. Linn. Gen. 1026. Spec. 21. p 754.
Oſtindiſches Ruhrkraut. Linne Pflanzenſ. 9 Th. S. 292.

a. Der gemeinſchaftliche ſchuppichte Kelch.
   α. Eine abgeſonderte Schuppe.
b. Die zuſammengeſezte Krone.
c. Ein Zwitterkröngen.
d. Eine Feder der Saamenkrone.
e. Das Zwitterkröngen geöfnet.
f. Die fünf zuſammenhängenden Staubfäden.
g. Der Fruchtknoten, Griffel und zweyſpaltige Narbe.

Wächſt in Afrika.
Nach der Natur.

Tab. 233.

Aſter tenuifolius. Linn. Gen. 1034. Spec. 14. p. 802.
Schmalblättrichte Sternblume. Linne Pflanzenſ. 9 Th. S. 379.

a. Der Kelch.
b. Die Krone.
c. Ein weibliches Kröngen aus dem Strahle.
d. Dieſes ohne die Saamenkrone.
e. Der Griffel mit den zwey Narben.
f. Der Fruchtknoten mit der Saamenkrone.
g. Die Scheibe mit den Zwitterkröngen.
h. Ein Zwitterkröngen mit der Saamenkrone.

i. Dieſes ohne dieſelbe.
k. Dieſes geöfnet.
l. Die fünf verwachſenen Staubfäden und ein abgeſonderter.
m. Der Stempfel.
n. Saamen mit der Krone.

Wächſt im mitternächtlichen Amerika.

Nach der Natur.

Tab. 234.

Pectis punctata. Lin. Gen. 1047. Spec. 2. p. 843.
Gedupfte Angerblume. Linne Pflanzenſ. 9 Th. S. 464.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 196.

Tab. 235.

Eclipta punctata. Linn. Gen. Spec. 3. p. 875.

Wächſt in Domingo, Martinique ꝛc. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 197.

Tab. 236.

Polymnia Wedelia. Linn. Gen. 1070 Spec. 2. p. 922.
Virginiſche Polymnie. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 10.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 198.

Tab. 237.

Arctotis acaulis. Lin. Gen. 1074. Spec. 10. p. 930.
Stammloſes Bärenohr. Linn. Pflanzenſ. 10 Th. S. 34.

Wächſt auf dem Vorgebürge der guten Hofnung.

Trew Tab. 93.

Tab. 238.

Lobelia longiflora. Linn. Gen. 1091. Spec. 11. p. 956.
Langblumige Lobelie. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 64.
a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Domingo, Kuba, Jamaika ꝛc. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 200.

Tab. 239.

Lobelia Cardinalis. Linn. Gen. 1091. Spec. 13. p. 957.
Kardinalsblume. Linn. Pflanzenſyſt. 10 Th. S. 65.
a. Die fünfzähnige Blumendecke.
b. Dieſe mit der Blume.
c. Die Blume allein.
d. Die fünftheilige Krone geöfnet.
e. Die Geſchlechtstheile.
f. Die in eine Walze zuſammengewachſene fünf Staubfäden.

g. Eben

g. Eben dieſe geöfnet.
h. Die fünf verwachſenen Staubbeutel.
i. Eben dieſe geöfnet, und beide vergröſſert.
k. Der Stempfel.
l. Die Saamenkapſel natürlich und vergröſſert.
m. Eben dieſe durchgeſchnitten.
n. Saamen, natürlich und vergröſſert.

Wächſt in Virginien.

Miller illuſtr. Tab. 71.

Tab. 240.

Kleinia ruderalis. Jacq.

Wächſt in Martinique und Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab 195.

EX CLASSE XXma.

Tab. 241.

Epidendrum coccineum. Linn. Gen. 1101. Spec. 6. p. 36.
Scharlachrothe Vanille. Linne Pflanzenſ. 10Th. S. 112.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 205.

Tab. 242.

Epidendrum ſecundum. Linn. Gen. 1101. Spec. 7. p. 36.
Einſeitige Vanille. Linne Pflanzenſ. 10Th. S. 113.
a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 207.

Tab. 243.

Epidendrum lineare. Linn. Gen. 1101. Spec. 8. p. 36.
Gleichbreite Vanille. Linne Pflanzenſ. 10Th. S. 113.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 201.

Tab. 244.

Epidendrum ciliare. Linn. Gen. 1101. Spec. 12. p. 37.
Gefranzte Vanille. Lin. Pflanzenſ. 10 Th. S. 115.
a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Viermal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 209.

Tab. 245.

Epidendrum nocturnum. Linn. Gen. 1101. Spec. 13. p. 37.
Nächtliche Vanille. Lin. Pflanzenſ. 10 Th. S. 115.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 210.

Tab. 246.

Epidendrum nodoſum. Linn. Gen. 1101. Spec. 15. p. 38.
Knotige Vanille. Linne Pflanzenſyſt. 10 Th. S. 116.

a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in der Inſel Baru. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 213.

Tab. 247.

Epidendrum ophioglosſoides. Linn. Gen. 1101. Spec. 28. p. 41.
Natterzungenartige Vanille. Lin. Pflanzenſ. 10 Th. S. 122.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 211.

Tab. 248.

Epidendrum ruſcifolium. Linn. Gen. 1101. Spec. 29. p 41.
Mäuſedornblätrige Vanille. Linn. Pflanzenſyſt. 10 Th. S. 123.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 212.

Tab. 249.

Epidendrum ramoſum. Jacq.
Epidendrum foliis caulinis oblongis, emarginatis, obtuſis, caule ramoſo. Gen. 1101.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 202.

Tab. 250.

Epidendrum globoſum. Jacq.
Epidendrum foliis caulinis ſubulatis ſulcatis; floribus terminalibus ſubſolitariis.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 203.

Lippia hemisphærica. L

Barleria hirsuta. J.

Duranta Ellisia. L.

Volkameria aculeata. L.

Cl. 14 Tab. 205.

Avicennia nitida L.

Columnea scandens. L.

Cl. 14 Tab 207.

Melianthus major. L.

Cl: 14 Tab 208.

Russelia sarmentosa. J

Cleome procumbens. L.

Geranium peltatum L.

Geranium odoratissimum L.



Geranium triſte. L.

Brownea coccinea. L

Pentapetes phoenicea. L.

Bombax pentandrum. L.





Bombax pentandrum L.



Sida triquetra L.

Sida cristata L.

Hibiscus spinifex. L.

a

b

Morisonia americana. L.

Securidaca volubilis. L.

Nissolia fruticosa. L.

Dolichos altissimus L.

Dolichos urens L.

Dolichos ruber. F.

Galega littoralis. L.

Cl: 17 Tab 227.

Galega caribaea. L.

Theobroma angusta. L.

Spilanthus urens L.

Spilanthus brasiliensis. L.

Artemisia chinensis. L.

Gnaphalium orientale L.

Aster teretifolius. L.

54741

Pectis punctata. L.

Eclipta punctata L.

Polymnia Wedelia L.

Cl: 19. Tab 237

Arctotis acaulis L

Lobelia longiflora L.

Lobelia cardinalis L.

Kleinia ruderalis. J

Epidendrum coccineum.



Epidendrum secundum L.



Epidendrum lineare L.



Epidendrum ciliare. L.

Epidendrum nocturnum. L.

Epidendrum nodosum L.



Epidendrum ophioglossoides L.

Epidendrum ruscifolium. L.

Epidendrum ramosum. J.

Epidendrum globosum J.

Amerikaniſche

Gewächſe

nach

Linneiſcher Ordnung.

Des dritten Hunderts zwote Hälfte.

von

Tab. 281. bis 300.

Nürnberg,
auf Koſten der Raſpiſchen Buchhandlung.
1788.

Tab. 251.

Epidendrum rigidum. Jacquin.

Epidendrum foliis caulinis oblongis, obtuſis, ſpathis longitudine floris aequantibus. Gen. 1101.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 204.

Tab. 252.

Epidendrum difforme. Jacquin.

Epidendrum foliis caulinis oblongis, floribus terminalibus, aggregatis, nectarii tubo longitudine corollae. Gen. 1101.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 206.

Tab. 253.

Epidendrum anceps. Jacquin.

Epidendrum foliis caulinis oblongis, ſpicis laxis, nectarii labio inferiori ſemitrilobo, caule ancipiti. Gen. 1101.

Wächſt in Martinique. Die Hälfte größer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 208.

Tab. 254.

Epidendrum carthaginenſe. Jacquin.

Epidendrum foliis radicalibus lanceolato-oblongis, acutis, planis, racemo compoſito. Gen. 1101.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 214.

Tab. 255.

Epidendrum altiſſimum. Jacq.

Epidendrum foliis radicalibus enſiformi-oblongis, baſi carinatis, ſuperne planis racemo compoſito. Gen. 1101.

a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Viermal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 215.

Tab. 256.

Epidendrum tetrapetalum. Jacq.

Epidendrum foliis radicalibus ſubulatis carinatis, racemo ſimplici, corolla ſubtetrapetala. Gen. 1101.

a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Jamaika und Ferri. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 216.

Tab. 257.

Epidendrum Cebolleta. Jacq.
Epidendr. folio radiculi unico, ſubulato, nodo radicato, racemo compoſito. Gen. 1101.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 217.

Tab. 258. 259.

Paſſiflora quadrangularis. Lin. Gen. 1110. Spec. 6. p. 48.
Viereckigte Paſionsblume. Lin. Pflanzenſ. 4 Th. S. 451.

a. Saamen.
b. Die Frucht. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 218.

Tab. 260.

Paſſiflora laurifolia. Linn. Gen. 1110. Spec. 7. p. 48.
Lorbeerblättertichte Paſſionsblume. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 453.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 219.

Tab. 261.

Ariſtolochia petandra. Linn. Gen. 1111. Spec. 3. p. 56.
Fünffädige Oſterluzey. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 472.

Wächſt in Havana. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 224.

Tab 262.

Ariſtolochia peltata. Linn. Gen. 1111. Spec. 4 p. 57.
Schildförmige Oſterluzey. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 473.

a. Eine Blume in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 222.

Tab. 263. 264.

Ariſtolochia maxima. Linn. Gen. 1111. Spec. 5 p. 57.
Gröſte Oſterluzey. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 474.

a. Eine Blume.
b. Die Saamenkapſel.
c. Saamen, alle drey in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 223.

Tab.

Tab. 265.

Ariſtolochia caudata. Linn. Gen. 1111. Spec. 9. p. 58.
Geſchwänzte Oſterluzey. Lin. Pflanzenſ. 4 Th. S. 477.

a. Eine Blume.
b. Die Frucht.
c. Saame, alle drey in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 221.

Tab. 266.

Piſtia Stratiotes. Linn. Gen. 1112. Spec. 1. p. 62.
Fremde Muſchelblume. Linn. Pflanzenſ. 10 Th. S. 129.

a. Die Blume.
b. Die Frucht, beide vergröſſert.

Wächſt in Kuba und Domingo. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 225.

Tab. 267.

Helicteres barvenſis. Linn. Gen. 1114. Spec. 1. p. 63.
Barvenſiſcher Schraubenbaum Linne Pflanzenſyſt. 2 Th. S. 252.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in der Inſel Baru. Um die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 227.

Tab. 268.

Helicteres Iſora. Linn. Gen. 1114. Spec. 2. p. 64.
Iſora. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 254.

a. Der aufgeſchnittene Kelch.
b. b. Blumenblätter.
c. Die Frucht.
d. Eine einzelne Saamenkapſel.
e. Saamen, alle fünf in natürlicher Gröſſe.
f. Die Geſchlechtstheile.
g. Der Stempfel. Beide vergröſſert.

Wächſt in Jamaika. Dreimal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 226.

Tab. 269.

Helicteres carthaginenſis. Linn. Gen. 1114. Spec. 5. p. 65.
Karthaginenſiſcher Schraubenbaum. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 256.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 228.

Tab. 270.

Arum ſeguinum. Linn. Gen. 1118. Spec. 19. p. 73.
Giftiger Aron. Linne Pflanzenſyſt. 10 Th. S. 147.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 229.

Tab. 271.

Arum hederaceum. Linn. Gen. 1118. Spec. 20. p. 73.
Epheuartiger Aron. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 148.
a. Der Blumenkolben in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 230.

Tab. 272.

Pothos acaulis. Linn. Gen. 1122. Spec. 2. p. 76.
Stammlooſer Pothos. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 156.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 231.

EX CLASSE XXIma.

Tab. 273.

Elaterium carthaginenſe. Linn. Gen. 1128. Spec. 1. p. 91.
Weſtindiſcher Springſaame. Linne Pflanzenſyſt. 10 Th. S. 162.
a. Die Frucht.
b. Dieſe aufgeſprungen.
c. Saamen, dieſer in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 232.

Tab. 274.

Anguria trilobata. Linn. Gen. 1129. Spec. 1. p. 91.
Dreylappichte Angurie. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 163.
a. Der Kelch aufgeſchnitten mit einem Kronblat und den Staubfäden, in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 234.

Tab. 275.

Anguria pedata. Linn. Gen. 1129. Spec. 2. p. 92.
Fußförmige Angurie. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 164.
a. Eine männliche Blume.
b. Eine weibliche Blume.
c. Die Frucht.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 233.

Tab. 276.

Axyris pentandra. Jacquin.
Axyris foliis ſerrato dentatis, floribus maſculis pentandris. Gen. 1138.
a. Die Frucht.
b. Ein Fach der Kapſel von innen.

c. Saa-

c. Saamen, in natürlicher Gröſſe.
d. Frucht, und
e. Saamen, vergröſſert.

Wächſt in Kuba.

Jacquin Tab. 235.

Tab. 277.

Dalechampia ſcandens. Linn. Gen 1179. Spec. 1. p. 181.

Kletternde Dalechampe. Linne Pflanzenſ. 10 Th. S. 223.

a. Die Blume mit den Geſchlechtstheilen von auſſen.
b. Eben dieſe von innen.
c. Die Frucht, alle drey in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 239.

Tab. 278.

Acalypha villoſa. Jacquin.

Acalypha involucris femineis dentatis villoſiſſimis, foliis ovatis acuminatis petiolo longioribus. Gen. 1180.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 240.

Tab. 279.

Acalypha corenſis. Jacquin.

Acalypha involucris femininis triphyllis, foliis lanceolatis. Gen. 1180.

Wächſt in Domingo, Martinique und Venezuela. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 241.

Tab. 280.

Croton balſamiferum. Linn. Gen. 1181. Sp. 13. p. 187.
Balſam Croton. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 524.

Wächſt in Kuracao und Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 242.

Tab. 281.

Croton polygamum. Jacquin.
Croton foliis lanceolato ſerratis, pilis decompoſitis raris obſitis. Gen. 1181.

a. Ein Theil eines blätterichten Zweiges, in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Nicht viel gröſſer als die Abbildung.

Jacquin Tab. 243.

Tab.

Tab. 282.

Jatropha Ianipha. Linn. Gen. 1183. Spec. 6. p. 193.
Janipha. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 539.

a. Das Honigbehältniß der männlichen Blüthe mit einem Staubfaden.
b. Die Frucht.
c. Ein Drittheil der dreyfächerigen Saamenkapsel.
d. Eine Klappe der Kapsel.

Wächst in Karthagena. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 244.

Tab. 283.

Hippomane Mancinella. Linn. Gen. 1186. Spec. 1. p. 195.
Gemeiner Manchinelbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 384.

a. Die abgefallene zeitige Frucht.

Wächst in den Karibäen.

Jacquin Tab. 238.

Tab. 284.

Hippomane biglandulosa. Linn. Gen. 1186. Spec. 2 p. 196.
Sapium aucuparium. Jacq.
Zweydrüsichter Manchinelbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 390.

a. Der Kelch der weiblichen Blüthe.
b. Die weibliche Blüthe.
c. Die männliche Blüthe.
d. Der Staubfaden.
e. Die Frucht.
f. Saamen Alle in natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 237.

Tab. 285.

Momordica Charantia. Linn. Gen. 1191. Spec. 2. p. 200.
Gurkenartiger Balsamapfel. Linne Pflanzensyst. 10 Th. S. 231.

Männliche Blume.

a. Die fünftheilige Blumendecke von oben und unten.
b. Die fünftheilige Krone.
c. Die Staubfäden.
d. Die Seite mit zweyspaltigen Staubbeuteln.
e. Die Seite mit einem zweyspaltigen und einem einfachen Staubbeutel.

Weibliche Blume.

f. Die Blumendecke, oben. Mit dem Stempfel.
g. Eben diese vergrössert.
h. Eben diese mit den drey unfruchtbaren Trägern.

i. Der

i. Der Griffel, und die drey bucklichten Narben.
k. Die Frucht,
l. Diese durchgeschnitten.
m. Der Saame mit dem Mark.
n. Saamen von beiden Seiten.

Wächst in Indien.

Miller illustr. Tab. 83.

Tab. 286.

Chayota edulis Jacqu.

a. Die männliche Blüthe.
b. Die weibliche Blüthe, beyde in natürlicher Grösse.
c. Die Frucht.
d. Ein Blatt, beyde sind noch so groß in der Natur.

Wächst in Kuba.

Jacquin Tab. 245.

Ex Classe XXIIda.

Tab. 287.

Caturus ramiflorus. Linn. Gen. 1206. Spec. 2. p. 239.

Aufblühender Caturus. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 575.

Wächst in Martinique. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 236.

Tab. 288.

Batis maritima. Lin Gen. 1208. Spec. 1. p. 240.

Seestrands Batis. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 577.

a. Ein Zweig, mit weiblichen Blüthen.
b. Männliche Blüthe.

Wächst in den Karibäen.

Jacquin Tab. 246.

Tab. 289. 290.

Carica papaya. Linn. Gen. 1232. Spec. 1. p. 267.

Der gemeine Papayabaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 454.

Männliche Blume.

Tab. 289.

a. Der fünftheilige Kelch.
b. Dieser von oben.
c. Die Krone mit fünftheiliger Mündung.
d. Diese geöfnet, mit den zehn Staubfäden.
e. Ein Blatt: sind sechs bis achtmal größer in der Natur.
f. Die Ansicht des ganzen Baums, dieser war neun Fuß hoch, und unten vier Zoll dick.

Nach der Natur.

Weibliche Pflanze.

Tab. 290.

a. Eine Zwitterblume, die aber sehr selten sind.
b. Die weibliche Blüthe.
c. Der sehr kleine Kelch.
d. Der Fruchtknoten durchgeschnitten.
e. Die Frucht, mit dem Saamen, durchgeschnitten.
f. Saamen, in seine weisse Haut noch eingeschlossen.

Wächst in Indien.

Trew Tab. 7.

EX CLASSE XXIIIa.

Tab. 291.

Clusia alba. Linn. Gen. 1263. Spec. 2. p. 328.
Weisse Cluste. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 287.

Wächst in Martinique. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 250.

Tab. 292.

Clusia flava. Linn. Gen. 1263. Spec. 3. p. 328.
Gelbe Cluste. Linne Pflanzenf. 2 Th. S. 488.

Wächst in Jamaika und Ferri. Um die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 251.

Tab. 293. 294.

Mimosa fagifolia. Linn. Gen. 1271. Spec. 2. p. 338.
Buchenblättrige Sinnpflanze. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 656.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächst in Martinique. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 247.

EX CLASSE XXIVta.

Tab. 295.

Lycopodium dichotomum. Jacquin.
Lycopodium foliis quinquepartitis linearibus acuminatis, integerrimis, caule dichotomo, floribus axillaribus. Gen. 1302.

Wächst in Martinique. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 252.

EX CLASSE PALMARVM.

Tab. 296.

Cocos Guineensis Linn. Gen. 1338. Spec. 2. p. 634.
Guineische Kokospalme. Linne Pflanzenf. 1 Th. S. 112.

a. Die Steinfrucht.

b. Die

b. Die Nuß.
c. Der Kern.
d. Ein Blatt.

Wächſt in Karthagena.

Jacquin Tab. 256.

Tab. 297.

Cocos aculeatus. Jacq.

Cocos trunco foliisque aculeatis. Gen. 1338.

a. Die Frucht.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 254.

Tab. 298.

Elais Guineenſis. Linn. Gen. 1340. Spec. 1. p. 635.

Guineiſche Oelpalme. Linne Pflanzenſ. 1 Th. S. 133.

a. Die Frucht.
b. Die Nuß.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 257.

Tab. 299.

Areca oleracea Linn. Gen. 1341. Spec. 2. p. 636.

Kohltragende Arekapalme. Linne Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 154.

a. Die Steinfrucht.
b. Die Nuß.
c. Der Kern.
d. Dieſer durchgeſchnitten.

Wächſt in den Karibäen.

Jacquin Tab. 255.

Tab. 300.

Gyrocarpus americanus. Jacq.

a. Ein Blatt.
b. Die Frucht.
c. Der Saame.
d. Dieſer durchgeſchnitten.

Wächſt in Karthagena.

Die Blüthe dieſes Baums hat Herr Jacquin nicht geſehen, und konnte dahero die Klaſſe nicht beſtimmen.

Jacquin Tab. 258.

INDEX

Acalypha corenſis Tab. 279
— — villoſa - 278
Achras mammoſa - 114
— — ſapota - 115
Amaryllis atamaſco - 111
— — bella donna - 112
Amyris ſylvatica - 125
Anchuſa italica - 22
Anguria pedata - 275
— — trilobata - 274
Annona muricata - 187
— — ſquamoſa - 188. 189
Aquartia aculeata - 16
Aquilegia canadenſis - 184
Aralia arborea - 97
Arctotis acaulis - 237
Areca oleracea - 299
Ariſtolochia caudata - 265
— — maxima 263. 264
— — peltata - 262
— — pentandra 261
Artemiſia chinenſis - 231
Arum hederaceum - 271
— Seguinum - 270
Aſclepias gigantea - 93
Aſter tenuifolius - 233
Atropa phyſaloides - 44
Avicennia tomentoſa Tab. 205
Axyris pentandra - 276
Ballota ſuaveolens - 191
Barleria hirſuta - 202
Batis maritima - 288
Besleria criſtata - 194
Bignonia paniculata - 195
— — ſtans - 196
Bombax pentandrum 215. 216
Brownea coccinea - 213
Burſera gummifera - 116
Cactus flagelliformis - 154
Calliſia repens - 13
Calophyllum Calaba - 177
Cameraria latifolia - 82
Canna indica - 1
Capparis Breynia - 167
— — cynophallophora 163
— — euſtachiana - 169
— — ferruginea - 162
— — frondoſa - 161
— — haſtata - 168
— — iamaicenſis - 171
— — linearis - 166
— — nemoroſa - 173
— — pulcherrima 164. 165
— — tenuiſiliqua - 172

Capparis

Capparis verrucoſa Tab. 170
Capraria biflora 200
Carica papaya 289. 290
Caſſyta baccifera 134
— — filiformis 133
Caturus ramiflorus 287
Cerbera Theuetia 68
Chayota edulis 286
Chiococca racemoſa 36
Chomelia ſpinoſa 21
Chryſobalanus Icaco 157
Chryſophyllum argenteum 60
— — — Cainito 57. 58
— — — glabrum 59
— — — microphyllum 61
Cinchona caribaea 33
Ciſſus ficyodes 17
Cleome procumbens 209
Cluſia alba 291
— — flava 292
Coccoloba diverſifolia 132
— — excoriata 128
— — flaveſcens 131
— — obtuſifolia 130
— — punctata 129
— — uvifera 127
Coccos aculeatus 297
— — guineenſis 296
Coffea occidentalis 35
Columnea ſcandens 206
Conocarpus erecta 39
— — racemoſa 40
Convolvulus martinicenſis T. 24
Corchorus hirſutus 181
Cordia Sebeſtena 53
Craniolaria annua 193
Craſſula coccinea 98
Creſcentia Cujete 198
Crinum zeylanicum 110
Croton balſamiferum 280
— — polygamum 281
Cyanchum altiſſimum 89
— — clauſum 92
— — filiforme 91
— — longiflorum 90
— — maritimum 87
— — planiflorum 85
— — racemoſum 86
— — undulatum 88
Cytharexylum cinereum 197
Dalechampia ſcandens 277
Datura Tatula 43
Dolichos altiſſimus 223
— — ruber 225
— — urens 224
Duranta Elliſia 203
Echites agglutinata 74
— — biflora 71
— — corymboſa 78
— — quinquangularis 72
— — repens 80
— — ſpicata 79
— — ſuberecta 73
— — toruloſa 75

Echites trifida Tab. 77
— — umbellata - 76
Eclipta punctata - 235
Ehretia Bourreria - 54
Elais guineenſis - 298
Elaterium carthaginenſe 273
Epidendrum altiſſimum 255
— — anceps - 253
— — carthaginenſe 254
— — cebolleta - 257
— — ciliare - 244
— — coccineum 241
— — difformе - 252
— — globoſum - 250
— — lineare - 243
— — nocturnum 245
— — nodoſum - 246
— — ophiogloſſoides 247
— — ramoſum - 249
— — rigidum - 251
— — ruſcifolium 248
— — ſecundum - 242
— — tetrapetalum 256
Erythroxylum areolatum 143
— — havanenſe 144
Eugenia pſeudo-pſidium 156
Euphorbia graminea - 153
— — tithymaloides 152
Fagara tragodes - 18
Galega caribaea - 227
— — littoralis - 226
Gardenia florida - 69
Gentiana aphylla - 96
Geranium odoratiſſimum 211
— — peltatum - 210
— — triſte - 212
Ginora americana - 151
Gnaphalium orientale - 232
Gyrocarpus americanus 300
Haemanthus puniceus - 105
Hamemelia patens - 37
Hedyotis americana - 14
Heiſteria coccinea - 139
Helicteres barvenſis - 267
— — carthaginenſis 269
— — iſora - 268
Hibiſcus ſpinifex - 219
Hillia paraſitica - 120
Hippomane biglanduloſa 284
— — Mancinella - 283
Hirtella americana - 64
Hypocratea volubilis - 11
Iacquinia armillaris - 49
— — linearis - 51
— — ruſcifolia - 50
Iatropha janipha - 282
Illecebrum ficoideum - 66
Ipomea carnea - 26
— — coccinea - 25
— — filiformis - 28
— — repanda - 27
Iris martinicenſis - 12
Iuſtitia carthaginenſis - 5
— — euſtachiana - 7

Iuſticia martinicenſis Tab. 8
— — pectoralis — 6
— — ſeſſilis — 4
— — ſpinoſa — 3
Ixora alternifolia — 15
Kleinia ruderalis — 240
Laetia apetala — 178
Lecythis minor — 179. 180
Lippia hemisphaerica — 201
Lobelia cardinalis — 239
— — longiflora — 238
Loranthus americanus — 118
— — ſpicatus — 119
— — uniflorus — 117
Lycopodium dichotomum 295
Magnolia grandiflora 185. 186
Mammea americana — 176
Marcgrafia umbellata — 160
Melaſtoma diſcolor — 140
Melianthus major — 207
Melicocca bijuga — 124
Meſembryanthemum noctiflorum — 159
Mimoſa fagifolia 293. 294
Momordica charantia — 285
Morinda muſcoſa — 38
Moriſonia americana — 220
Muntingia calabura — 174
Muſſaenda formoſa — 41
— — ſpinoſa — 42
Mygínda uragoga — 20
Myroſpermum fruteſcens 146
Nerium Oleander Tab. 70
Niſſolia fruticoſa — 222
Oenothera octovalvis — 123
Pancratium amboinenſe 107
— — declinatum — 109
— — illyricum — 106
— — littorale — 108
Parkinſonia aculeata — 135
Paſſiflora laurifolia — 260
— — quadrangularis 258. 259
Pectis punctata — 234
Pentapetes phoenicea — 214
Peplis tetrandra — 121
Petiveria octandra — 122
Petraea volubilis — 199
Piſtia ſtratiotes — 266
Plumbago ſcandens — 23
Plumeria alba — 81
Poeonia tenuifolia 182. 183
Poinciana pulcherrima — 136
Polymnia Wedelia — 236
Portlandia grandiflora — 31
— — hexandra — 32
Portulaca patens — 150
— — triangularis — 149
Pothos acaulis — 272
Piſidium pyriferum — 155
Pſychotria herbacea — 34
Rauwolfia tomentoſa — 67
Rhamnus colubrinus — 63
— — cubenſis — 62
Rivina octandra — 19

Rondeletia obovata Tab. 29
— — trifoliata — 30
Ruſſelia ſarmentoſa — 208
Ruyſchia cluſiaefolia — 100
Samyda nitida — 142
— — parviflora — 141
Sarracenia flava — 175
Sauvageſia erecta — 65
Scaevola lobelia — 52
Scutellaria havanenſis — 192
Securidaca volubilis — 221
Seſuvium portulacaſtrum 158
Sida criſtata — 218
— triquetra — 217
Solanum havanenſe — 45
— — inſanum — 47
— — racemoſum — 46
— — triſte — 48
Spilanthus braſilienſis — 230
— — urens — 229
Spondias myrobalanus 145
Stapelia hirſuta — 95
Stapelia variegata Tab. 94
Tabernaemontana citrifolia 83
— — — grandiflora 84
Teucrium cubenſe — 190
Theobroma auguſta — 228
Tillandſia lingulata — 101
— — polyſtachia — 103
— — tenuifolia — 102
Tradeſcantia geniculata 104
Trichilia trifoliata — 137
Triumfetta bartramia — 147
— — ſemitriloba — 148
Utricularia alpina — 9
Varronia bullata — 55
— — martinicenſis — 56
Verbena lappulacea — 10
Veronica virginica — 2
Viſcoides pendulum — 99
Volkameria aculeata — 204
Ximenia americana — 126
Yucca filamentoſa — 113
Zygophyllum arboreum 138

Epidendrum rigidum. J.

Epidendrum difforme. J.

Epidendrum anceps. J.

Epidendrum carthaginense. J.

Epidendrum altissimum. f.



Epidendrum tetrapetalum. F.

Epidendrum cebolleta. L.

Passiflora quadrangularis L.

b.

Passiflora quadrangularis. L.

Passiflora laurifolia. L.

Aristolochia pentandra. L.

Aristolochia peltata. L.

Aristolochia maxima. L.

Claß 20. Tab. 264.



Aristolochia
maxima. L.



Aristolochia caudata. L.



Pistia Stratiotes. L.

Helicteres barvensis. L.

Helicteres Hora. L.

Helicteres carthaginensis. L.

Arum seguinum. L.

Arum hederaceum. L.

Pothos acaulis. L.

Elaterium carthaginense L.

Anguria trilobata L.

Anguria pedata. L.



Axyris pentandra. J.

Dalechampia scandens L.

Acalypha villosa J.

Acalypha corensis. J.

Croton balsamiferum. L

Croton polygamum. F.



Jatropha Janipha. L.

a

Hippomane mancinella L.

Hippomane biglandulosa. L.

Momordica Charantia. L.

Chayota edulis. F

Caturus ramiflorus. L.

Batis maritima. L.

Carica Papaya L

Carica Papaya. L.

Clusia alba. L

Clusia flava . L.

Mimosa fagifolia. L.



Mimosa fagifolia

Cl: 24 Tab: 295.

Lycopodium dichotomum. 1.

Coccos guineensis. L.

Coccos aculeatus. J.

Elais guineensis. L.



Areca oleracea. L.

Gyrocarpus americanus J

00054741

Digitized with financial assistance from
Observer Research Foundation
on 17 May, 2019